

Flumiderm[®]

Crema

Amplio rango terapéutico
para la recuperación de la piel y el pelo

1. Acción micótica

Amplio espectro antimicótico para el tratamiento de fungosis de la piel y estructuras accesorias.

2. Acción antibiótica

Efectivo antimicrobiano contra bacterias gram-positivas y gram-negativas en infecciones superficiales de la piel y en piodermas.

3. Acción anti-inflamatoria

Controla la inflamación, reduce la alergia y el prurito.



Flumiderm[®]
por la integridad de la piel

Flumiderm®

Crema antimicótica - antibiótica - anti-inflamatoria
por la integridad de la piel

DESCRIPCIÓN:

Fluconazol: es un derivado del imidazol. En los hongos, modifica la permeabilidad de la membrana celular de los micetos y por inhibición de síntesis proteica interfiere la incorporación de aminoácidos esenciales para los hongos, produciendo necrosis de las células fúngicas. Penetra el estrato córneo de la piel. No se absorbe por aplicación cutánea, ni alcanza el nivel sistémico. Actúa en forma rápida contra el prurito que frecuentemente se presenta en las infecciones por dermatófitos y levaduras.

Neomicina: es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro, que altera la permeabilidad de la membrana bacteriana y en el citoplasma bacteriano se une principalmente a la unidad ribosomal 30S, y en menor proporción a la 50S, bloqueando la síntesis de péptidos, alteraciones que inducen a la bacteriolisis. Tiene excelente acción antibacteriana en infecciones primarias o secundarias en la piel, uñas, oídos y vagina, sin desarrollar resistencia por aplicación tópica.

Betametasona: es un anti-inflamatorio corticosteroide, con acción anti-pruriginosa y antialérgica. Reduce y controla la inflamación desde la fase inicial del proceso. Prepara las estructuras y tejidos para su restauración y su normal funcionamiento facilitando la penetración y acción antibiótica.

Evita la erosión de la piel por rascado y automutilación, en casos de prurito agudo.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 g de Flumiderm contienen:	
Fluconazol.....	2 g
Neomicina sulfato.....	0,5 g
Betametasona.....	0,05 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES:

Indicado en perros, gatos, caballos, bovinos y otros animales domésticos, para el tratamiento tópico de infecciones de la piel causadas por hongos y bacterias.

Dermatofitos: *Trichophyton rubrum*, *T. verrucosum*, *T. mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporium canis*.

Levaduras: *Candida albicans*. Mohos: *Nocardia sp.*, *Malassezia sp.*

En dermatomicosis mixtas: infecciones en las que participa más de una especie de micetos.

Bacterias gram-positivas: *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Mycobacterium sp.*

Bacterias gram-negativas: *Klebsiella sp.*, *Shigella sp.*, *E. coli*, *Proteus sp.*, *Aerobacter sp.*, *Enterobacter aerogenes*, *Pasteurella sp.*, *Salmonella sp.*, *Bacillus pertussis*.

Flumiderm está indicado para el tratamiento de lesiones producidas por hongos en piel, pelo y uñas, con caída del pelo y ulceraciones.

En dermatitis alérgicas y en alteraciones de oído externo o pabellón de la oreja.

Flumiderm produce la remisión de los síntomas, la recuperación de la estructura de la piel y la reaparición de pelo normal en corto tiempo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

MODO DE EMPLEO:

- Lavar y secar la zona afectada
- Aplicar suficiente cantidad de **Flumiderm** sobre la zona de la piel implicada, esparcir la crema de manera uniforme, cubriendo la superficie adyacente.
- Repetir el tratamiento una o dos veces al día, hasta la desaparición de los síntomas.

Prolongar el tratamiento hasta asegurar el control de la infección.

En vacas, en el tratamiento de la ubre y los pezones, aplicar después del ordeño.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN:

Tubo colapsible por 40 g

Registro ICA 7243-MV

Servicio al cliente

318 347 66 28

313 850 10 91

321 468 11 29

servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com

www.cellsfarmaceutica.com

