

Ungüento Cells[®]

Anti-inflamatorio y analgésico

**más potencia
anti-inflamatoria**

Recupera
la función músculo-articular

Reduce
el tiempo de convalecencia



Ungüento Cells[®]

Reduce la inflamación y alivia el dolor

Ungüento Cells®

**más potencia
anti-inflamatoria**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 gramos de **Ungüento Cells** contienen:

Piroxicam.....	1 g
Salicilato de metilo.....	10 g
Alcanfor.....	5 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

DESCRIPCIÓN:

Piroxicam: es un agente anti-inflamatorio no esteroideo, AINE, de alta potencia, indicado para el tratamiento de afecciones caracterizadas por inflamación y dolor.

Es eficaz en el tratamiento de lesiones musculo - esqueléticas agudas, tendinitis, epicondilitis, tendosinovitis y osteoartritis.

Salicilato de metilo: es un éster del ácido salicílico y del metanol. Tiene acción rubefaciente, penetra en los tejidos inflamados e induce calor y relajación muscular en la zona afectada. Es un analgésico tópico para aliviar dolor en músculos y articulaciones.

Alcanfor: es un aceite aromático que actúa como analgésico y tiene acción anestésica local leve. Se absorbe por la piel generando sensación de frío que ayuda al control del prurito.

INDICACIONES:

En bovinos, equinos, caprinos, ovinos, cerdos, perros y gatos como anti-inflamatorio y analgésico de uso externo. Tratamiento sintomático del dolor muscular y articular relacionado con esguinces, contusiones y artritis.

Coadyuvante en el tratamiento de inflamación de origen traumático en músculos y articulaciones. En vacas, coadyuvante en el control del edema puerperal y de inflamación de la glándula mamaria por traumatismo.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida.



MODO DE EMPLEO:

- Lavar con una solución antiséptica y secar la zona afectada.
- Aplicar suficiente cantidad de **Ungüento Cells** sobre la zona y hacer masaje de moderada intensidad y duración.
- Repetir el tratamiento dos veces al día, hasta la desaparición de los síntomas.

En algunos casos puede producirse enrojecimiento o ardor moderados en la zona de aplicación, por la acción rubefaciente del medicamento, que desaparecen al término del tratamiento.

PRECAUCIONES:

- El producto no debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- En tratamiento de la glándula mamaria, aplicar después del ordeño.
- Proteger la piel del sol directo durante el tratamiento.

Lavarse bien las manos después de la aplicación. En caso de reacción adversa, eritema y escozor severos en el sitio de aplicación, suspender la administración y consultar al Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN:

- Pote por 50 g
- Pote por 100 g
- Pote por 250 g

Registro ICA 7083-MV



Servicio al cliente

318 347 66 28

313 850 10 91

321 468 11 29

servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com

www.cellsfarmaceutica.com