

Melalgic[®] oral

Terapia fácil y eficaz
del dolor y la inflamación

Acción rápida y prolongada
para el control seguro del dolor

Potente acción
Con efectos secundarios mínimos

Administración oral
que permite la continuidad
del tratamiento



Melalgic®

Analgésico - antiinflamatorio - antipirético
Suspensión oral - Gotas



Respuesta eficaz
al dolor y la inflamación

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de **Melalgic** contienen:
Meloxicam.....150 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

DESCRIPCIÓN:

Melalgic, es un AINE del grupo del oxicam. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, es inhibidor selectivo COX-2, en 90%, por lo que reduce los efectos adversos erosivos de esta ciclooxigenasa (inducible). Su efecto es menor sobre COX-1 (constitutiva con acción citoprotectora), 40%, que depende de la dosis, la frecuencia y la duración de la administración.

Su efecto analgésico se observa a los 50-60 minutos después de la aplicación y se obtienen concentraciones plasmáticas máximas a las 7-8 horas.

Se distribuye en un 97% por unión a proteínas plasmáticas. Se metaboliza principalmente en el hígado, produciendo metabolitos inactivos que se eliminan, con una mínima porción del activo sin alterar, por vía fecal. El tiempo medio de eliminación es de 12 - 36 horas. Este tiempo se alarga en tratamientos prolongados y puede darse la acumulación del principio activo en tejidos.

INDICACIONES:

En perros y gatos para el control del dolor y la inflamación por traumatismo músculo-esquelético agudo y crónico. En osteoartritis, en algunos casos clínicos, se logran resultados favorables, aunque se debe tener precaución con la administración por tiempo prolongado. Reduce la inflamación y el dolor antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES:

- No administrar a animales hipersensibles al meloxicam.
- No utilizar en animales con deficiencia hepática, cardíaca o renal, o con alteraciones hemorrágicas o gastrointestinales.
- No administrar conjuntamente con otros AINE, corticosteroides ni medicamentos que alteren la coagulación.

DOSIS:

Perros

El primer día de tratamiento, administrar 0,2 mg por 1 kg de peso.
En la práctica 2 gotas por kg de peso. 1 mL por 7,5 kg.
A partir del segundo día de tratamiento, administrar 0,1 mg por 1 kg de peso.
En la práctica 1 gota por kg de peso. 0,5 mL por 7,5 kg.
Frecuencia: Cada 24 horas, durante 5 - 7 días.

Gatos

El primer día de tratamiento, administrar 0,3 mg por 1 kg de peso.
En la práctica 3 gotas por kg de peso. 1 mL por 5 kg.
A partir del segundo día de tratamiento, administrar 0,1 mg por 1 kg de peso.
En la práctica 1 gota por kg de peso. 0,5 mL por 7,5 kg.
Frecuencia: Cada 24 horas, durante 4 - 5 días.
Sin embargo, la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, directamente en la boca o mezclado con agua o leche. También, puede administrarse con el alimento preferido.

PRECAUCIONES:

- Tener bajo control cuadros clínicos complicados con deshidratación, hipovolemia e hipotensión.
 - En gatos formular tratamientos de corta duración, hasta cinco días.
 - Los tratamientos prolongados pueden generar falla renal.
 - No administrar a animales menores de 6 semanas.
- La seguridad de su uso en animales en gestación o lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero por 10 mL

Registro ICA 9058-MV



Servicio al cliente

318 347 6628
servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com
www.cellsfarmaceutica.com

