Protozid®

Suspensión oral

Antiprotozoario y antibacteriano para perros y gatos

Respuesta eficaz

a infecciones de alto riesgo por agentes patógenos letales

Control de parásitos protozoarios

Giardia, Trichomona, Entamoeba

Control de bacterias anaerobias

Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus

Protozid®

Primera opción en el control de protozoarios

Protozid®

Antiprotozoario y antibacteriano para perros y gatos

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de **Protozid** contienen:
Metronidazol benzoilo..... 2.5 g

DESCRIPCIÓN:
El metronidazol es un antiprotozoario giardicida, tricomonicida y amebicida, del grupo de los nitroimidazoles, con acción antimicrobiana contra bacterias anaerobias. El espectro de actividad del metronidazol incluye protozoos sensibles: giardias, amebas y tricomonas.
En microorganismos anaerobios actúa sobre las proteínas que participan en la cadena respiratoria, mientras que en otros protozoarios se introduce entre las cadenas de ADN inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos.

INDICACIONES:
En perros y gatos para el tratamiento de las infecciones causadas por protozoos y bacterias anaerobias obligatorias.
Protozoarios: *Giardia canis y Giardia felis. Trichomona sp, Entamoeba histolytica.*
Bacterias: *Bacteroides sp., Fusobacterium sp, Veillonella sp, Clostridium sp., Eubacterium sp., Peptostreptococcus sp.*

USOS:
En tratamiento y control de gastritis y duodenitis por *Peptostreptococcus sp.*, en giardiasis por *Giardia canis y Giardia felis* y en amebiasis intestinal y hepática por *Entamoeba histolytica.*
En infecciones genitales: uretritis, tricomoniasis, por *Trichomona sp.*
Coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal o de las encías.
Coadyuvante en el tratamiento de la estomatitis de origen bacteriano, en gatos.

DOSIS:
En perros: 15 - 30 mg/kg, dos veces al día, durante 5 -7 días.
En la práctica 0,3 – 0,6 mL por cada 5 kg de peso.
En gatos: 10 - 25 mg/kg, dos veces al día, durante 5 -7 días.
En la práctica 0,2 - 0,5 mL por cada 5 kg de peso.
Sin embargo, la dosis y la duración del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.
Agitar antes de la administración.

PRECAUCIONES:
No administrar en hembras en periodo de gestación o lactancia.
No usar simultáneamente con cimetidina y fenobarbital.
No usar en animales con hipersensibilidad a los imidazólicos o con enfermedades activas del Sistema Nervioso Central.
Suspender el tratamiento en caso de que se produzcan efectos secundarios e informar al Médico Veterinario.
Utilizar con precaución, a la dosis mínima, en animales con enfermedad hepática o renal.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN:
Jeringas graduadas por 10 mL y 20 mL
Frasco por 50 mL

Registro ICA 9586-MV

Servicio al cliente
318 347 6628
servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com
www.cellsfarmaceutica.com

CELLS FARMACÉUTICA

Productos especializados para la salud animal