

Doxirem[®]

**Antibiótico oral de amplio espectro
para perros y gatos**

Control de infecciones bacterianas

*Bacterias gram-positivas y gram-negativas,
micoplasmas y clamidias.*

Control de erliquiosis

Rickettsias (Ehrlichia canis)



Máxima eficacia

- *por rápida acción*
- *por facilidad de dosificación*
- *por cumplimiento terapéutico*

Doxirem[®]

Tabletas

**Tratamiento antibiótico
de máxima eficacia**

Doxirem® 200

Tabletas

Tratamiento antibiótico de máxima eficacia



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada tableta de **Doxirem** contiene:
Doxiciclina (hiclato).....200 mg
Excipientes c.s.p.....300 mg

DESCRIPCIÓN

La doxiciclina, es un antibiótico bacteriostático del grupo de las tetraciclinas de amplio espectro y rápida acción contra bacterias gram-positivas y gram-negativas, micoplasmas, clamidias y rickettsias. Bloquea el ARN en la síntesis de proteínas de bacterias y rickettsias, a nivel de la subunidad 30 S de los ribosomas bacterianos. Por vía oral, tiene una rápida absorción del 50%, y alcanza un máximo de 80%.

INDICACIONES

En perros y gatos para el tratamiento de infecciones causadas por *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Bordetella sp.*, *Brucella sp.*, *Bartonella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Pasteurella multocida*, *Shigella sp.* y *Yersinia pestis*. *Actinomyces sp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Listeria monocytogenes*, *Nocardia sp.*, *Mycoplasma sp.*, *Chlamydia sp.*, *Rickettsia sp.*

Tratamiento de:

Infecciones respiratorias producidas por complicaciones bacterianas de enfermedades virales como moquillo y rinotraqueitis infecciosa felina.

Infecciones bacterianas dermatológicas por *Haemobartonella*, *Mycoplasma* y *Chlamydia*. Infecciones de los sistemas digestivo, genitourinario y óseo.

Erliquiosis (*Ehrlichia canis*).

Infecciones bucodentarias: gingivitis, periodontitis y estomatitis, halitosis.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en hembras en gestación.

DOSIS

1 tableta de Doxiciclina 200 por cada 20 kg de peso (10 mg/kg) cada 12 - 24 horas durante 3 - 5 días.

En infecciones crónicas el tratamiento puede prolongarse por 10 - 20 días. Sin embargo, la dosis como la frecuencia y la duración del tratamiento quedan a criterio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Administrar al tiempo con las comidas

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Caja por 10 tabletas

Registro ICA 10036-MV

Servicio al cliente

Tel. 318 608 4799

servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com

www.cellsfarmaceutica.com



Productos especializados para la salud animal

CELLS
FARMACÉUTICA